



M.G. VANNINI  
OSPEDALE RELIGIOSO  
CLASSIFICATO ACCREDITATO  
ISTITUTO FIGLIE DI SAN CAMILLO

# CORSO ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA



IL PARTO SI AVVICINA:  
QUANDO RECARSI  
IN OSPEDALE

*OSTETRICA*

*SEVI LAILA*

**DIVENTARE MADRE E' UNA ESPERIENZA INCREDIBILE.**

IL PARTO E' UN AVVENIMENTO DI GRANDE PORTATA SIMBOLICA PER LA COPPIA

ALL'AVVICINARSI DEL MOMENTO , I PENSIERI SONO SEMPRE PIU' FOCALIZZATI SU COME  
E COSA FARE QUANDO INIZIERA' IL TRAVAGLIO,



MA SOPRATTUTTO QUANDO ANDARE IN OSPEDALE



M.G. VANNINI  
OSPEDALE RELIGIOSO  
CLASSIFICATO ACCREDITATO  
ISTITUTO FIGLIE DI SAN CAMILLO

# CORSO ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA

## L'INIZIO DEL TRAVAGLIO PUO' AVVENIRE GRADUALMENTE O IMPROVVISAMENTE.

---



LE CONTRAZIONI POSSONO ESSERE INIZIALMENTE IRREGOLARI.

LA FREQUENZA E LA DURATA E' VARIA. QUESTE SONO DEFINITE CONTRAZIONI DI

«**BRAXTON HICKS**»

LA GESTANTE AVVERTE DOLORE IN SEDE OVARICA DURANTE QUESTA FASE DETTA PRODROMICA (DI PREPARAZIONE) PUO' VERIFICARSI LA PERDITA DEL TAPPO MUCOSO. QUESTA FASE PUO' VARIARE E DURARE ANCHE 6-8 ORE E A VOLTE ANCHE DI PIU'. E' CONSIGLIATO UN BAGNO CALDO E LA SUPERVISIONE E PREPARAZIONE DI TUTTO L'OCCORRENTE DA PORTARE IN OSPEDALE.

**N.B. RICORDATEVI LA CARTELLINA DI TUTTI GLI ESAMI ESEGUITI IN GRAVIDANZA**



**M.G. VANNINI**  
OSPEDALE RELIGIOSO  
CLASSIFICATO ACCREDITATO  
ISTITUTO FIGLIE DI SAN CAMILLO

# CORSO ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA

IL PASSAGGIO DELLE CONTRAZIONI PREPARATORIE A QUELLE DA TRAVAGLIO NON E' SEMPRE NETTO.  
IN QUESTA FASE LE CONTRAZIONI POSSONO VARIARE DI INTENSITA' ANCHE SE REGOLARI NELLA FREQUENZA .

CI SONO SEGNALI INCONFUTABILI CHE CI FANNO CAPIRE CHE IL TRAVAGLIO E' INIZIATO.  
LE CONTRAZIONI DIVENTANO PIU' DOLOROSE AD INTERVALLI REGOLARI SIA NELLA FREQUENZA CHE NELLA DURATA.

IL CONSIGLIO E' DI ANDARE IN OSPEDALE QUANDO SI AVVERTONO CONTRAZIONI UTERINE DOLOROSE CHE SI SUSSEGUONO AD INTERVALLI REGOLARI DI TEMPO. OGNI 8-10 MINUTI ED HANNO UNA DURATA DI CIRCA 30 SEC.

**N.B. IL TEMPO CHE INTERCORRE TRA LE CONTRAZIONI E SEMPRE MISURATO IN MINUTI  
IL TEMPO CHE MISURA LA CONTRAZIONE E' SOLO IN SECONDI**

## **CI SONO ALTRE SITUAZIONI IN CUI E' OPPORTUNO RECARSIS IN OSPEDALE ANCHE IN ASSENZA DI CONTRAZIONI.**

- PERDITA DI LIQUIDO AMNIOTICO  
ROTTURA SPONTANEA DEL SACCO AMNIOTICO  
QUESTO PUO' AVVENIRE ANCHE IN ASSENZA DI CONTRAZIONI.
- PERDITA DI SANGUE ROSSO VIVO DALLA VAGINA.
- DOLORI VIOLENTI E IMPROVVISI ALL'ADDOME E ALLA REGIONE LOMBARE
- ASSENZA DI PERCEZIONE DEI MOVIMENTI FETALI
- AUMENTO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA
- QUALSIASI SINTOMO INATTESO O MALESSERE IMPROVVISO