



<p><b>OSPEDALE M. G. VANNINI ROMA</b></p>  <p>UOC Radiodiagnostica per immagini</p>	<p><b>SCHEDA INFORMATIVA</b></p> <p><b>CISTO-URETROGRAFIA RETROGRADA E MINZIONALE</b></p>	 <p>Sistema Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015 (NR 501007901/3)</p>
--	---	--

**CHE COS'E'**

E' l'indagine radiologica della vescica e dell'uretra eseguita mediante opacizzazione retrograda, grazie alla somministrazione di un mezzo di contrasto a base di iodio attraverso un catetere.

Poiché si tratta di un esame che espone a radiazioni ionizzanti se ne deve evitare l'utilizzo in assenza di una indicazione clinica specifica; inoltre le donne in età fertile devono escludere gravidanze in corso (per il possibile rischio di danni al feto).

**A COSA SERVE**

Questa tecnica è fondamentale nello studio anatomico della vescica, dell'uretra e come indagine funzionale per evidenziare un eventuale reflusso (anomalo passaggio di urina dalla vescica negli ureteri).

Può essere indicata nello studio di alcune condizioni patologiche uretro-vescicali (calcoli, diverticoli, cistiti complicate, reflusso vescico – ureterale, tumori).

**COME SI EFFETTUA**

Si introduce nell'uretra un catetere attraverso il quale si inietta il mezzo di contrasto, la vescica viene quindi distesa e successivamente il paziente viene invitato ad urinare, tutte queste fasi vengono documentate con immagini radiografiche.

Durante l'esecuzione dell'esame il paziente assume diverse posizioni a giudizio del Medico Radiologo ed è invitato a mantenere l'immobilità. L'esame non è particolarmente doloroso.

**COSA PUO'SUCCEDERE – EVENTUALI COMPLICANZE**

In alcuni casi possono verificarsi: temporanee emorragie nella vescica e/o bruciore alla prima minzione successiva all'esame e infezioni. Anche se raramente, si possono verificare lesioni dell'uretra o della vescica da perforazione meccanica.

I medici ed il personale della radiologia sono addestrati per curare nel miglior modo possibile questi eventi, nel caso si verificassero.

**PREPARAZIONE NECESSARIA – RACCOMANDAZIONI**

E' generalmente consigliabile che il paziente esegua una copertura antibiotica per ridurre il rischio di infezioni. Non è necessario interrompere eventuali terapie farmacologiche in corso (ad es. per l'ipertensione o il diabete).